



Lo studio aderisce a:



PEDIATRIA DI GRUPPO 0-14 DI PADERNO DUGNANO

(dott.sse P. Beretta, ML Cappuccilli, G. Colavita, A. Giurgola e dott. M.Villa)

COLICHE GASSOSE

Si tratta di un disturbo, peraltro abbastanza frequente, e che non comporta alcun danno permanente, caratterizzato da pianto intenso e persistente che a volte si accompagna a flessione delle cosce sul bacino ed emissione di gas dall'intestino. Tali manifestazioni compaiono dalla 3^a-4^a settimana di vita e a volte si prolungano fino al 3^o-4^o mese, presentandosi nelle ore pomeridiane, più frequentemente dalle ore 18 alle 22.

Per ridurre questi fastidiosi sintomi evitate che il piccolo assuma aria durante il pasto e se lo allattate al seno evitate di bere una eccessiva quantità di latte vaccino.

E' stato empiricamente constatato di recente che la somministrazione di Reuflor (o Reuterin) 5 gtt al giorno tutti i giorni nel periodo classico delle coliche ne riduce notevolmente la frequenza e la intensità.

Per alleviare il dolore stendete il bambino sulle vostre ginocchia a pancia in giù massaggiandogli la schiena, oppure liberatelo dei panni massaggiandogli piano l'addome. In caso non basti, potete tentare di aiutarlo a liberarsi dell'aria introducendo un sondino rettale (imbevuto di glicerina) nell'ano.

Nel caso questi rimedi falliscano è possibile tentare con piccole dosi di sedativi* da usarsi solo per brevi periodi e dietro consiglio medico.

Comunque le coliche gassose migliorano spontaneamente con il tempo e si risolvono verso il 3^o-4^o mese di vita.

*Alginor gtt.: 3 gtt x Kg di peso al bisogno (fino a 3 volte al dì).

**WEB: Su tutti i motori di ricerca cercate: poliambulatorio 0-14
Dal Sito potete scaricare questo foglio e altro ancora....**