

# BRONCOPOLMONITE

## CHE COS'È?

È un'infezione del polmone che ostacola la normale respirazione.

## COME SI MANIFESTA?

Può manifestarsi con uno o più dei seguenti sintomi: respiro molto veloce e affannoso, movimenti anormali del torace durante il respiro, febbre e dolore toracico, febbre e grave malessere (brividi), febbre elevata che dura da molti giorni senza sintomi che la giustificano, tosse insistente e che dura da molti giorni, febbre con dolore addominale molto intenso.

## CHE COSA LA PROVOCA?

Può essere causata da virus o da batteri, talvolta da entrambi assieme.

## CONSEGUENZE DELLA MALATTIA

La gravità della polmonite è molto variabile: può essere in alcuni casi una malattia poco grave, di solito quando è provocata da un virus; qualche volta invece può essere molto severa.

Va trattata con antibiotico, qualunque sia la causa che l'ha provocata, per evitare possibili complicanze.

## DECORSO DELLA MALATTIA

Con la terapia antibiotica in genere il miglioramento dei sintomi è rapido (24-48 ore).

Nelle forme provocate da virus, però, il miglioramento è più lento e graduale, e la malattia può durare 2-4 settimane, con al termine comunque una guarigione completa.

## COSA FARE

- Consultate il pediatra: attraverso una visita potrà rilevare, se sono presenti, dei segni che gli permetteranno di riconoscere la malattia. Altrimenti, se la visita non è sufficiente a confermare il sospetto di broncopolmonite, in alcuni casi prescriverà una radiografia del torace.
- Ai bambini che presentano broncopolmonite il pediatra prescriverà la terapia antibiotica.
- La maggior parte dei bambini con broncopolmonite può essere curata a casa.  
Solo in pochi casi può essere necessario il ricovero:
  - quando il bambino ha meno di 3 mesi di età e la febbre (se ha meno di 2 mesi di età anche senza febbre)
  - quando il bambino sta molto male (vomita, è disidratato, non cammina o vuole stare solo in braccio, è poco reattivo, lamentoso, sonnolento, ipereccitabile, piange; ha un colorito pallido o bluastro, gli occhi alonati, l'espressione spenta)
  - quando ha segni di grave difficoltà a respirare (respiro veloce e affannoso, rientramenti tra le costole, colorito bluastro)
  - quando la polmonite non appare grave ma è complicata da un versamento di liquido nella pleura
  - quando il pediatra ritiene che a casa non sia possibile e sicura l'esecuzione delle terapie e dell'assistenza necessarie.
- Somministrare liquidi per tenere idratato il bambino.

- Non è invece opportuno usare farmaci sedativi della tosse; utilizzarli solo in casi particolari, quando la tosse disturba molto, specie la notte.
- Anche i mucolitici non sono necessari, probabilmente non modificano il decorso della malattia.

DOMANDE PER IL TUO PEDIATRA:

.....

.....

.....

.....

.....