

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

Sta scaricando il **materiale di informazione medico scientifica** depositato in AIFA, relativo alle specialità medicinali attinenti alle tematiche trattate al **congresso.**

Cocyntal[®]

DENOMINAZIONE

Cocyntal[®]

Soluzione orale in contenitore monodose

COMPOSIZIONE

Ogni contenitore monodose da 1 ml contiene:

Carbo vegetabilis 5 CH

Colocynthis 9 CH

Cuprum metallicum 5 CH

aa 0,333 ml

Eccipienti: Acqua purificata.

Le diluizioni omeopatiche presenti in **Cocyntal[®]** sono preparate in conformità alle Monografie N° 2371 e N° 1038 della Farmacopea Europea in vigore e alle monografie delle materie prime per preparazioni omeopatiche presenti nella Farmacopea Francese e/o Europea in vigore: "Carbo vegetabilis pour préparations homéopathiques", "Colocynthis pour préparations homéopathiques" e "Cuprum metallicum pour préparations homéopathiques".

FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale in contenitore monodose.

CONFEZIONE

20 contenitori monodose in 4 sacchetti da 5 monodosi.



www.boiron.it

Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

CAMPO DI APPLICAZIONE

Coliche del neonato e del lattante

Cocyntal® contiene Carbo vegetabilis, Colocynthis, Cuprum metallicum, sostanze per le quali la letteratura omeopatica indica:

Carbo vegetabilis

"Coliche addominali acute nel bambino: è il primo farmaco da utilizzare, perfetto nelle coliche di un lattante dall'addome gonfio e teso."

Fonte bibliografica: Micciché GM. OMEOPATIA e PEDIATRIA Esperienza clinica e schemi terapeutici. Ed. Tecniche Nuove; Vol.3; p.142-143.

"Coliche nell'addome, provocate dall'accumulo di gas."

Fonte bibliografica: Kent JT. Matière médicale homéopathique. 4° Ed. 1981. p.317-331.

"Abbondante flatulenza, specialmente dopo i pasti."

Fonte bibliografica: Clarke JH. A dictionary of practical Materia Medica. The Homeopathic Publishing Company. Vol. I. Londra; 1925. p.397-405.

"Meteorismo addominale. Addome disteso con gas."

Fonte bibliografica: Deltombe M, Jagerschmidt G. Abrégé de matière médicale du tout-petit. 1994. p.40.

"Colica flatulenta crampiforme."

Fonte bibliografica: Clarke JH. A dictionary of practical Materia Medica. The Homeopathic Publishing Company. Vol. I. Londra; 1925. p.397-405.

Colocynthis

"Colica post-prandiale del lattante."

Fonte bibliografica: Poncet J, Picot C. Troubles digestifs du nourrisson et de l'enfant. Homéopathie. Encycl. Méd. Chir. Parigi; 1985. p.1.

"Coliche spasmodiche, Coliche del lattante (iperalgisia, che migliorano sdraiandosi sul ventre)."

Fonte bibliografica: Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. Pharmacologie et Matière médicale homéopathique. 3rd Ed. 2003. p.288-291.

"Per dolori addominali acuti, intermittenti, che si attenuano se il bambino si piega sull'addome."

Fonte bibliografica: Micciché GM. OMEOPATIA e PEDIATRIA Esperienza clinica e schemi terapeutici. Ed. Tecniche Nuove; Vol.3; p.142-143.

"Bambino collerico con dolori parossistici

estremamente violenti, accompagnati da urla, che costringono il bambino a stare rannicchiato.”

Fonte bibliografica: Poncet J, Picot C. Troubles digestifs du nourrisson et de l'enfant. Homéopathie. Encycl. Méd. Chir. Parigi; 1985. p.1.

“Tensione addominale: dolorante al tatto.”

“Tensione nell’addome con passaggio di gas e dolore simil-colica.”

Fonte bibliografica: Allen TF. The Encyclopedia of Pure Materia Medica. A record of the positive effects of drugs upon the healthy human organism, 1877, Reprint Edition. 1995. Vol.4. p.477-507.

“Coliche intestinali violente parossistiche, con agitazione e irritabilità. Migliorano stando su se stessi, piegandosi in avanti.”

Fonte bibliografica: Voisin H. Matière médicale du praticien homéopathe, 1st ed. p.415-418.

Cuprum metallicum

“Coliche post-prandiali del lattante.”

Fonte bibliografica: Poncet J, Picot C. Troubles digestifs du nourrisson et de l'enfant. Homéopathie. Encycl. Méd. Chir. Parigi; 1985. p.1.

“Coliche del lattante: crisi violente che cessano all’improvviso.”

Fonte bibliografica: Boulet J, Demonceaux A, Donner F, Lévêque Y. Schémas et protocoles. La pratique au quotidien. CEDH, Paris; 2013. p.5-7.

“Crampi o coliche intestinali molto dolorose.”

“Meteorismo addominale.”

Fonte bibliografica: Voisin H. Matière médicale du praticien homéopathe. 1st ed. p.449-454.

“Coliche spasmodiche molto violente.”

Fonte bibliografica: Guermonprez M, Pinkas M, Torck M. Matière Médicale Homéopathique. 2nd Ed. 1997. p.180-181.

“Colica violenta intermittente.”

Fonte bibliografica: Allen TF. The encyclopedia of Pure Materia Medica. A record of the positive effects of drugs upon the healthy human organism. Vol. 2. 1877. p.10.

POSOLOGIA E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

POSOLOGIA

Da 1 a 8 contenitori monodose, nelle 24 ore distanziando le assunzioni di un’ora.

Diradare le assunzioni in base al miglioramento e interromperle alla scomparsa dei sintomi.

La monodose può essere somministrata prima o dopo la poppata o il biberon.

Consultare il medico se i sintomi persistono.

Cocyntal® non contiene conservanti: utilizzare un nuovo contenitore monodose ad ogni somministrazione.

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale.

Aprire il sacchetto.

Staccare un contenitore monodose. Aprire il contenitore monodose ruotando il tappo. Si consiglia di tenere il lattante-bambino in posizione seduta: premendo leggermente il contenitore, versare l'intero contenuto direttamente in bocca, facendolo ingerire.

AVVERTENZE

Non utilizzare se allergico ad uno qualsiasi dei componenti di questo medicinale.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Cocyntal® contiene diluizioni omeopatiche, 5 CH e 9 CH, che per le loro basse concentrazioni molari, non presentano generalmente tossicità chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche, effetti indesiderati legati alle quantità assunte¹⁻⁷.

Cocyntal® in quanto medicinale omeopatico, permette l'uso concomitante di altre terapie farmacologiche^{1-3,8}, laddove necessario.

Cocyntal® è un medicinale che non contiene: zucchero, miele, saccarina, lattosio, aromatizzanti, conservanti.

Informazioni sul contenitore monodose

Il contenitore monodose è costituito da polietilene a bassa densità, materiale chimicamente inerte conforme alla Monografia 3.1.4 della Farmacopea Europea in vigore.

È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che consente una produzione aseptica integrata e che assicura simultaneamente la fabbricazione del contenitore monodose e la ripartizione sterile della soluzione sterilizzata. La peculiarità è quella di colare, riempire e sigillare i flaconi monodose in un'unica operazione continua, in locali ad atmosfera controllata^{9,10}.

CONSERVAZIONE

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

VALIDITÀ

3 anni dalla data di confezionamento del prodotto.

La validità si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

CLASSIFICAZIONE

Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate.

Medicinale omeopatico ex art. 20 D.Lgs. 219/2006. In Italia, le indicazioni terapeutiche di tutti i medicinali omeopatici non sono ancora state approvate; ai medici ed ai farmacisti possono essere ricordati posologia e campi di applicazione mediante pubblicazioni tratte da una delle farmacopee europee o dalla letteratura omeopatica o antroposofica, a norma dell'art. 120, comma 1-bis, del D. Lgs. 219/2006.

È per questo che la confezione di **Cocyntal®** non riporta indicazioni terapeutiche ed è priva del foglietto illustrativo. I medici ed i farmacisti ricoprono un ruolo ancor più fondamentale nell'educazione del paziente ad un corretto utilizzo del medicinale omeopatico.

REGIME DI RIMBORSABILITÀ E DISPENSAZIONE AL PUBBLICO

Medicinale non a carico del SSN. Come tutti i medicinali può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Prezzo indicativo

€ 16,50

Titolare BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Produttore BOIRON

1 rue Edouard Buffard – ZAC des Frênes
77144 Montévrain - France



Via Uberto Visconti di Modrone 33
20122 Milano

BIBLIOGRAFIA

1. Boulet J. Homéopathie - L'enfant. Marabout. 2003. p.15,16.
2. Rocher C. Homéopathie - La femme enceinte. Marabout. 2003. p.14-17.
3. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. Volume I. Ariete Salute; 1993. p.81,94-96.
4. Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic and Antroposophic Medicinal Products.
5. Latour E, Tétau M. Guide homéopathique de la Sage-Femme. Paris: Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7.
6. Kirby BJ. Safety of homeopathic products. J R Soc Med. 2002; 95(5):221,222. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/>
7. D.Lgs. 219/2006 Art.16, comma 1 c). G.U. Serie generale n. 142 del 21/6/2006.
8. Boiron M, Payre-Ficot A. Omeopatia Il Manuale per il farmacista. Milano: Tecniche Nuove; 2001. p.23.
9. Berrebi H. Le système Bottelpack répond aux besoins de la pharmacie. Emballage Magazine; 1985. p.4-9.
10. Bourny E, Dumolard L, Peronnet A. Remplissage intégré aseptique: la technologie blow-fill-seal (BFS) dans l'industrie pharmaceutique. S.T.P. Pharma Pratiques; 1995. 5(3). p.203-214.

"A norma dell'art. 120, comma 1-bis del D.Lgs. 219/2006 trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell'efficacia del medicinale omeopatico."

