Proposta di comportamento relativamente alla fluoroprofilassi in età pediatrica

- Fino ad un anno nessuna somministrazione di fluoro.
- Da 1 a 3 anni iniziare appena possibile la somministrazione topica di fluoro: attraverso il dentifricio fluorato (vedi comportamento 3-6 anni) oppure i prodotti topici nel cavo orale.
- Da 3 a 6 anni lavarsi i denti due volte al giorno con dentifricio, contenente massimo 500 ppm di fluoro.
- Dopo i 6 anni lavarsi i denti due volte al giorno con dentifricio contenente 1000 ppm di fluoro.
- In caso di difficoltà o impossibilità a lavare regolarmente e correttamente i denti utilizzare gli integratori (dopo valutazione dell'assunzione di fluoro da altre fonti, in particolare l'acqua); da 6 mesi ai 3 anni: somministrare 0,25 mg/die di fluoro con gocce; da 3 a 6 anni: somministrare 0,50 mg/die di fluoro con gocce o pastiglie.
- Nei soggetti a medio e alto rischio di carie oltre all'uso scrupoloso del dentifricio fluorurato deve essere aggiunto un integratore: da 6 mesi ai 3 anni: somministrare 0,25 mg/die di fluoro con gocce; da 3 a 6 anni: somministrare 0,50 mg/die di fluoro con gocce o pastiglie.
- **Dose di dentifricio pea size**
- **Sputare il dentifricio, senza sciacquare il cavo orale**