

Inalazione di corpo estraneo

Cosa fare nel LATTANTE (0-12 mesi)

I bambini piccoli tendono a portare tutti gli oggetti alla bocca: è quindi importante evitare di lasciare a portata di mano del bambino oggetti piccoli che, se inalati (cioè se entrano nelle vie respiratorie) possano provocare un soffocamento.

Esempi di tali oggetti sono monete, bottoni, biglie, pezzi di cibo....).

Molti incidenti si potrebbero e si dovrebbero evitare con la prevenzione

Il comportamento è diverso se l'ostruzione delle vie respiratorie è completa o incompleta.

OSTRUZIONE INCOMPLETA: il bambino tossisce e piange

1. **NON** dare pacche sulle spalle
2. **NON** mettere le mani in bocca
3. **NON** metterlo a testa in giù
4. **NON** dargli da bere
5. Fallo stare nella posizione che preferisce
6. Chiama il 118

OSTRUZIONE COMPLETA : il bambino non tossisce e non riesce a piangere

ESEGUI LA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE DEL LATTANTE

Non tentare mai di togliere il corpo estraneo mettendo le dita in bocca al bambino

- metti il bambino sull'avambraccio, sostenendo con la mano la testa
- appoggia l'avambraccio sulla coscia e metti il bambino con la testa un poco in basso rispetto al tronco;
- dai **5 vigorosi colpi fra le due scapole** utilizzando il palmo della mano, indirizzandoli verso l'esterno;
- se il corpo estraneo non viene espulso, gira il bambino e con due dita fai **5 compressioni toraciche** a metà fra i due capezzoli



Continua alternando 5 pacche interscapolari con le 5 compressioni toraciche fino a quando il corpo estraneo viene espulso o il lattante diventa incosciente

Quando il lattante diventa incosciente inizia la manovra di Rianimazione RCP

Su You Tube cercando "disostruzione lattante" sono disponibili molti video che spiegano dettagliatamente la manovra di disostruzione del lattante.