

**SCHEDA INFORMATIVA
VACCINO MENINGOCOCCO**

Il **meningococco** è un batterio di cui si conoscono diversi tipi. La maggior parte delle malattie meningococciche nell'uomo è dovuta ai tipi A, B, C, W135 e Y: in Italia ed in Europa i più diffusi sono attualmente il B ed il C, mentre in Africa è prevalente il tipo A. Il meningococco può essere responsabile di infezioni di varia gravità e colpire soggetti di tutte le età. Quasi sempre le infezioni non danno sintomi o provocano solo una leggera infiammazione delle alte vie respiratorie. In alcuni casi il meningococco si diffonde al sistema nervoso o in tutto il corpo causando così meningite o sepsi, malattie gravi che possono determinare lesioni permanenti o portare alla morte. La trasmissione della malattia avviene tramite le goccioline di saliva.

VACCINO

Sono disponibili tre tipi di vaccino:

1. Un vaccino "coniugato" contro il **meningococco di gruppo C**, raccomandato ed offerto gratuitamente nel corso del 13°-15° mese di vita, in co-somministrazione con il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia; l'offerta gratuita prosegue per tutti i minori non vaccinati fino all'età di 10 anni. In caso si ritenga opportuno non aderire all'offerta, verrà richiesta la compilazione del modulo di dissenso.

Il vaccino può essere co-somministrato con altri vaccini in coerenza col Piano Nazionale Vaccini e le evidenze scientifiche.

2. Un vaccino contro il **meningococco di gruppo B**, raccomandato ed offerto gratuitamente ai bambini nati a partire dal primo gennaio 2017; in caso si ritenga opportuno non aderire all'offerta, verrà richiesta la compilazione del modulo di dissenso. Il vaccino è inoltre offerto gratuitamente ai soggetti, con età inferiore ai 50 anni, affetti da patologie che rendono più suscettibili all'infezione. La somministrazione di tale vaccino ad utenti ultracinquantenni, con condizioni cliniche che comportino un considerevole aumento del rischio di malattia invasiva, potrà essere valutata dal medico responsabile della seduta vaccinale.

3. Un vaccino tetravalente "coniugato" contro i **meningococchi di gruppo A-C-W135-Y**, **offerto attivamente in adolescenza** in concomitanza con le altre vaccinazioni, e **disponibile gratuitamente tra gli 11 ed i 18 anni**. L'offerta gratuita viene prevista anche per soggetti affetti da patologie che li rendono più suscettibili all'infezione.

Il vaccino è disponibile in co-pagamento per coloro che si recano in paesi a rischio.

Il vaccino può essere co-somministrato con altri vaccini in coerenza col Piano Nazionale Vaccini e le evidenze scientifiche.

Per la popolazione non coinvolta nell'offerta vaccinale sopra riportata è prevista la possibilità di accedere alle vaccinazioni contro il meningococco B, C, ACWY per protezione individuale, con la formula del co-pagamento.

I vaccini vengono somministrati per via intramuscolare.

CONTROINDICAZIONI

La vaccinazione è controindicata in caso di reazione allergica grave (anafilassi) dopo la somministrazione ad una precedente dose di vaccino o ad un suo componente

E' opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

EFFETTI COLLATERALI

La vaccinazione è di solito ben tollerata. Le reazioni nella sede dell'iniezione compaiono entro 24 - 48 ore e possono essere: rossore, gonfiore, dolore. Può venire rilevata febbre, cefalea ed irritabilità.

LOGO

Come per tutti i vaccini, non è possibile escludere l'eventualità di reazioni allergiche anche gravi come lo shock anafilattico.